FICHA TÉCNICA

TIPO DE FORMULACIÓN: Suspoemulsión (SE)

USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA.

INGREDIENTE ACTIVO:

- **SPIROXAMINA 250 g/L**

Nombre IUPAC: Spiroxamina: 8-*tert*-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine
No. CAS *118134-30-8.*

- **KRESOXIM METHYL 250 g/L**

Kresoxim methyl: methyl (E)-methoxyimino[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate
No. CAS *143390-89-0*

FORMULADOR:
INTEROC S.A.
Km16.5 vía Daule
Guayaquil, Ecuador

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3, Bodega 13.
Cota-Colombia
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055

REGISTRO NACIONAL ICA No. 826

MODO DE ACCIÓN:

MERIDIAN es un fungicida protectante, sistémico, curativo y erradicante. Penetra rápidamente al tejido foliar y es traslocado acropetalmente hacia la punta de la hoja. Inhibe la biosíntesis del esterol, la germinación de esporas, la enzima reductasa y la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia de electrones entre el sitio del citocromo b y c1.

USO AGRÍCOLA

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C	P.R
Tomate (*Lycopersicum esculentum*)	**Mildeo polvoso** (*Oidium Lycopersicum*)	0.3 cc/L	35 días	12 horas

Volumen de agua: 400 l/ha

*USO ORNAMENTALES			
CULTIVO	**BLANCO BIOLÓGICO**	**DOSIS**	**P.R**
Rosa (*Rosa sp.*)	**Oidium** (*Sphaerotheca pannosa*)	0.3 cc/L	12 horas

Volumen de agua: 400 l/ha

P.C: Período de carencia
P.R: Período de reentrada

** Pruebas de Fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus) Y POMPÓN (Crysantemum sp.).*
"Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada"

MODO DE EMPLEO:
MERIDIAN se aplica cuando se observan los primeros síntomas de la enfermedad (ataque temprano) y acorde con los niveles de infestación de la enfermedad y condiciones climáticas.

COMPATIBILIDAD:
Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a baja escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a grande escala. Si se utiliza este producto a la dosis recomendada en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

MERIDIAN es incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.

PRECAUCIONES:

No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar **MERIDIAN**, en la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.
Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en horas tempranas.
Evite contaminar con **MERIDIAN** las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

50cm³, 100cm³, 200cm³, 250cm³, 500cm³, 600cm³, y 1L, 3.6L 5L, 20L y 200L.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III. LIGERAMENTE PELIGROSO

AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

Fecha de revisión y actualización: 05 de Febrero del 2019.